

Henvist (skriftligt/telefonisk) af tandlæge XX for diagnostik og behandling af marginal parodontitis.

Bilag:

Sygdommens varighed:

Tidligere behandling:

Subjektive symptomer:

Objektive symptomer:

Tobaksforbrug:

Erhverv:

Anamnese i øvrigt:

Røntgen: Knoglesvind > 1/3

Røntgen: Vertikalt knoglesvind

Røntgen / klinik: Furkaturinvolvering:

Elektrometrisk vitalitetstest:

Blodtryk: /

Mundhygiejne:

Tandstilling:

Parodontaldiagram udfyldt.

BOP= %

Pus:

GENEREL DIAGNOSE:

Parodontitis marginalis chronica / aggressiva

ENKELTTANSDIAGNOSER:

Parodontitis totalis

Parodontitis marginalis gravis complicata

Parodontitis marginalis gravis

Parodontitis marginalis levis complicata

Parodontitis marginalis levis

PROGNOSE:

Håbløs:

Dårlig uanset behandling:

Dårlig uden kirurgi:

Dubiøs:

Rimelig:

God:

Indikation for antibiotika:

Mulighed for regeneration:

BEHANDLINGSFORSLAG:

OVERSLAG:

INFORMATION: Storrygning giver forøget risiko for parodontitis. Prognosen for behandling er lidt dårligere hos storrygere.